

(3) 本田期の防除

RPA

病害虫名	防除時期	薬剤名	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	
葉いもち	6月下旬 ～ 7月上旬	ブリン粉剤DL	U14, 16.1		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	2回以内	
		ブリンフロアブル	U14, 16.1		1000倍	60～150%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	
		トライフロアブル		U16		1000倍	60～150%/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内
					8倍	0.8%/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	2回以内	
	初発の10日前～初 発時	オリゼート1kg粒剤	P02		1～1.3kg/10a		収穫14日前まで	散布	2回以内	
		オリゼート粒剤	P02		3～4kg/10a		葉いもちには初発の10日前～初発 時穂いもちには出穂3～4週間前 収穫14日前まで	散布	2回以内	
		オリゼート粒剤20	P02		1kg/10a		収穫14日前まで	散布	2回以内	
		コラトップ1kg粒剤12	16		1～1.5kg/10a		葉いもちに対しては初発10日前～ 初発時 穂いもちに対しては出穂 30日前～5日前まで	散布	2回以内	
	初発の10日前～ 10日後	オリブライト250G	11		250g/10a		出穂10日前までただし、収穫45日 前まで	散布	1回	
	初発前	ルーチン粒剤	P03		1kg/10a		収穫30日前まで	澁水散布	2回以内	
穂いもち病	第2回目 穂揃直後	ラブサイドダントフロアブル	4A,1 6.1		8倍	800mL/10a	収穫7日前まで	無人ヘリコプターによる散布	3回以内	
		アミスターレボンSE	3A,1 1	8倍	800mL/10a	収穫14日前まで	空中散布	3回以内		
				1000倍	60～150%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内		
		トライフロアブル	U16	1000倍	60～150%/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内		
				8倍	0.8%/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	2回以内		
		ブリン粉剤DL	U14, 16.1		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	2回以内	
		ブリンフロアブル	U14, 16.1		1000倍	60～150%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	
		ビームイトEXゾル	4C,1 6.1	250倍	25%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内		
				8倍	0.8%/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内		
				1000倍	60～150%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内		
	ビームイトエクシードゾル	4C,1 6.1	250倍	25%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内			
			8倍	0.8%/10a	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内			
			1000倍	60～150%/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内			
	ビームスタークル粉剤5DL	4A,1		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内		
ビームイトモカットフロアブル	16,7		5～8倍	800mL/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	3回以内			
出穂3～4週間前	オリゼート粒剤	P02		3～4kg/10a		葉いもちには初発の10日前～初発 時穂いもちには出穂3～4週間前 収穫14日前まで	散布	2回以内		
出穂10日前頃	ワイドハンチ豆つぶ	2B,1		250g/10a		収穫35日前まで	散布	1回		
紋枯病	第1回目	バリタシン液剤5	U18		1000倍	60～150%/10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	
	穂ばらみ期 (垂直進展初期)	バリタシン粉剤DL	U18		3～4kg/10a		収穫14日前まで	散布	5回以内	
		アミスターレボンSE	11, 3A		8倍	800mL/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	3回以内	
	第2回目			1000倍	60～150%/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内		
	穂揃期	ビームイトモカットフロアブル	16,7		5～8倍	800mL/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	3回以内	
	出穂30日前～出穂 期	リンパ-粒剤	7		3～4kg/10a		収穫30日前まで	散布	2回以内	
	出穂30～10日前	モカット粒剤	7		3～4kg/10a		出穂30～10日前 但し、収穫14日前 まで	澁水散布	4回以内	
白葉枯病	移植活着後及び出 穂3～4週間前	オリゼート粒剤	P02		3～4kg/10a		移植活着後及び出穂3～4週間前 収穫14日前まで	散布	2回以内	
ごま葉枯病	第1回目穂ばらみ 期 第2回目穂揃期	ブリンフロアブル	P02		1000倍	60～150%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	
		ブリン粉剤DL	P02		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	2回以内	
稲こうじ病	出穂10日前まで	Zホルト-粉剤DL	P02		3～4kg/10a		出穂10日前まで	散布	-	
	穂ばらみ期	ブリン粉剤DL	P02		4kg/10a		収穫7日前まで	散布	2回以内	
もみ枯細菌 病	出穂3～4週間前	オリゼート1kg粒剤	P02		1～1.3kg/10a		収穫14日前まで	散布	2回以内	
		オリゼート粒剤	P02		3～4kg/10a		移植活着後及び出穂3～4週間前 収穫14日前まで	散布	2回以内	
イネヒメダカ バエ	5月中旬～6月上旬 (幼虫発生初期)	エルサン乳剤	1B	劇	1500～2000倍	60～150%/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	
		エルサン粉剤2	1B		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	2回以内	

病害虫名	防除時期	薬剤名	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数
イネゾウムシ成虫	5月中旬	エルサン粉剤2	1B		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	2回以内
イネミスゾウムシ (越冬成虫)	5月下旬	トレボン粒剤	3A		2~3kg/10a		収穫21日前まで	散布	3回以内
ニカメイチュウ第1世代	第1世代 粉液剤：発が最盛	エルサン乳剤	1B	劇	1000~1500倍	60~150% _{10a}	収穫7日前まで	散布	2回以内
ニカメイチュウ第2世代	期後15~20日頃 (6/15~20頃)	エルサン乳剤	1B	劇	800~1000倍	60~150% _{10a}	収穫7日前まで	散布	2回以内
ニカメイチュウ	粒剤：発が最盛期 10日後頃(6/10頃)	パダソンSG水溶剤	14	劇	1500倍	60~150% _{10a}	収穫21日前まで	散布	6回以内
		パダソン粒剤4	14	劇	3~4kg/10a		収穫30日前まで	散布	6回以内
イナゴ類	6月下旬~7月下旬	トレボン粉剤DL	3A		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
ツマグロヨコバイ	7月下旬~8月上旬 (第2世代幼虫発生初期) 8月中旬~8月下旬 (第3世代幼虫発生初期)	アルパリン粉剤DL	3A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		スタークル粉剤DL	3A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		ダントツH粉剤DL	3A		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		トレボン粉剤DL	3A		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		トレボン粒剤	3A		2~3kg/10a		収穫21日前まで	散布	3回以内
ウナギ類	7月下旬~8月上旬 (幼虫発生初期)	スタークル粉剤DL	4A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		アルパリン粉剤DL	4A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		ビームスタークル粉剤5DL	4A,1 6.1		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		トップジンスタークル粉剤DL	4A,1		3~4kg/10a		収穫14日前まで	散布	3回以内
		ダントツH粉剤DL	4A		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		トレボン粉剤DL	3A		3~4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		トレボン粒剤	3A		2~3kg/10a		収穫21日前まで	散布	3回以内
		アミスタートレボンSE	3A,1 1		1000倍	60~150% _{10a}	収穫14日前まで	散布	3回以内
					8倍	800mL/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布	3回以内
		ビームイトEXゾル	4C,1 6.1		8倍	0.8% _{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内
					250倍	25% _{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
					1000倍	60~150% _{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
		ビームイトエクシードゾル	4C,1 6.1		250倍	25% _{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
					8倍	0.8% _{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内
					1000倍	60~150% _{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
		エクシードフロアブル	4C		2000倍	60~150% _{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
					16倍	0.8% _{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内
		エクシード粉剤DL	4C		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
		エミリアフロアブル	4F		8倍	0.8% _{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	2回以内
	出穂7~10日後	スタークル豆つぶ	4A		250~ 500g/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内
アザヒコヤガ	6月下旬~7月上旬 (第1世代幼虫発生初期) 7月下旬~8月上旬 (第2世代幼虫発生初期)	スミチオン乳剤	1B		2000~4000倍	60~150% _{10a}	収穫21日前まで	散布	2回以内
イネトシ	6月下旬(第1世代) 7月下旬~8月上旬 (第2世代) 各世代とも若齢幼虫発生初期	パダソンSG水溶剤	14	劇	1500倍	60~150% _{10a}	収穫21日前まで	散布	6回以内
コブメイガ	7月中旬~8月中旬 (成虫飛来盛期~ 幼虫ふ化期)	スミチオン粉剤3DL	1B		3~4kg/10a		収穫21日前まで	散布	2回以内 (但し、出穂前は1回)

病害虫名	防除時期	薬剤名	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	
カメムシ類	早生・中生 第1回目：穂揃期 第2回目：糊熟初期	スミチオン粉剤3DL	1B		3～4kg/10a		収穫21日前まで	散布	2回以内 (但し、出穂前は1回)	
		スミチオン乳剤	1B		8倍	800mL/10a	収穫21日前まで	空中散布	2回以内	
	晩生は糊熟初期に1回のみ					8倍	800mL/10a	収穫21日前まで	無人航空機による散布	2回以内
		エクシード粉剤DL	4C		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内	
		エクシードフロアブル	4C		16倍	0.8% ^{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内	
					2000倍	60～150% ^{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内	
		トレボン粉剤DL	3A		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内	
		トレボンスターフロアブル	3A,4		8倍	0.8% ^{10a}	収穫14日前まで	無人航空機による散布	3回以内	
		トライトロン粉剤DL	3A,U 16			3～4kg/10a		収穫14日前まで	散布	2回以内
		アミスタートレボンSE	3A,1 1			1000倍	60～150% ^{10a}	収穫14日前まで	散布	3回以内
							8倍	800mL/10a	収穫14日前まで	無人航空機による散布
		エミリアフロアブル	4F		8倍	0.8% ^{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	2回以内	
		スタークル粉剤DL	4A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内	
		アルバリン粒剤	4A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内	
		トップジンスタークル粉剤DL	4A,1		3～4kg/10a		収穫14日前まで	散布	3回以内	
		ビームスタークル粉剤5DL	4A,1		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内	
		ビームイトスタークルゾル	4C,1 6.1			8倍	0.8% ^{10a}	収穫7日前まで	無人ヘリコプターによる散布	3回以内
						1000倍	60～150% ^{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
		ビームイトEXゾル	4C,1 6.1			8倍	0.8% ^{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内
						250倍	25% ^{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
						1000倍	60～150% ^{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内
	ビームイトエクシードゾル	4C,1 6.1			8倍	0.8% ^{10a}	収穫7日前まで	無人航空機による散布	3回以内	
					250倍	25% ^{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内	
					1000倍	60～150% ^{10a}	収穫7日前まで	散布	3回以内	
	ダントツH粉剤DL	4A		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内		
	ラブサイドダントツフロアブル	4A,1 6.1			8倍	800mL/10a	収穫7日前まで	無人ヘリコプターによる散布	3回以内	
8倍					800mL/10a	収穫7日前まで	空中散布	3回以内		
出穂10日前頃	キラップ粒剤	2B		3kg/10a		収穫14日前まで	湛水散布	2回以内		
	ワイドパンチ豆つぶ	2B,1		250g/10a		収穫35日前まで	散布	1回		
出穂期	ダントツ粒剤	4A		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内		
出穂7日後	アルバリン粒剤	4A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内		
	スタークル粒剤	4A		3kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内		
	スタークル豆つぶ	4A		250g/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内		
アザミウマ類	出穂直前	トレボン粉剤DL	3A		3～4kg/10a		収穫7日前まで	散布	3回以内	