## （２）湛水直播栽培における防除

RPA

| 病害虫名 | 薬剤名 | RAC | 毒劇 | 使用濃度 | 使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いもち病 | ﾙｰﾁﾝｼｰﾄﾞFS | P3 | | 乾燥種もみ1kg当り原液6～12mL(原液71mL/10aまで) | | は種前(浸種前) | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | 1回 |
| | | | | 乾燥種もみ1kg当り原液6～12mL(原液71mL/10aまで) | | は種前(浸種後) | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ中又はｺｰﾃｨﾝｸﾞ後の種もみに塗沫処理 | 1回 |
| | Dr.ｵﾘｾﾞﾌｪﾙﾃﾗ粒剤 | P2,28 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| 紋枯病 | ｴﾊﾞｰｺﾞﾙｼｰﾄﾞFS | 7 | | 乾燥種もみ1kg当り原液10mL(原液44mL/10aまで) | | は種前(浸種後) | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ中又はｺｰﾃｨﾝｸﾞ後の種もみに塗沫処理 | 1回 |
| | | | | 乾燥種もみ1kg当り原液10mL(原液44mL/10aまで) | | は種前(浸種前) | 塗沫処理(種子被覆剤を加用) | 1回 |
| | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| 苗腐病(ピシウム菌) | ｽｸｰﾃﾞﾘｱES | 4 | | 乾燥種もみ1kg当り原液5mL | | は種前 | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回 |
| ｳﾝｶ類 | ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ水和剤 | 4A | 劇 | 種もみ3kg当り150～200g(200g/10aまで) | | は種前 | 過酸化ｶﾙｼｳﾑ剤との同時湿粉衣 | 1回 |
| ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ | ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ水和剤 | 4A | 劇 | 種もみ3kg当り150～200g(200g/10aまで) | | は種前 | 過酸化ｶﾙｼｳﾑ剤との同時湿粉衣 | 1回 |
| ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ | ﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ | 4A | | 原液 | 種もみ3kg当り75mL/10a | は種前 | 塗沫処理 | 1回 |
| | ﾖｰﾊﾞﾙｼｰﾄﾞFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液11mL(原液55mL/10aまで) | | は種前(浸種後) | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ中又はｺｰﾃｨﾝｸﾞ後の種もみに塗沫処理 | 1回 |
| | Dr.ｵﾘｾﾞﾌｪﾙﾃﾗ粒剤 | P2,28 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ | ﾌｫﾙﾃﾝｻﾞFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液8mL | | は種前 | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回 |
| | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| | ﾙﾐﾋﾞｱFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液4～7mL | | は種前 | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回 |
| ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ | ﾖｰﾊﾞﾙｼｰﾄﾞFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液11mL(原液55mL/10aまで) | | は種前(浸種後) | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ中又はｺｰﾃｨﾝｸﾞ後の種もみに塗沫処理 | 1回 |
| | Dr.ｵﾘｾﾞﾌｪﾙﾃﾗ粒剤 | P2,28 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| | ﾙﾐﾋﾞｱFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液4～7mL | | は種前 | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回 |
| | ﾌｫﾙﾃﾝｻﾞFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液8mL | | は種前 | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回 |
| ｷﾘｳｼﾞｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| ﾆｶﾒｲﾁｭｳ | ﾖｰﾊﾞﾙｼｰﾄﾞFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液11mL(原液55mL/10aまで) | | は種前(浸種後) | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ中又はｺｰﾃｨﾝｸﾞ後の種もみに塗沫処理 | 1回 |
| | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| | ﾙﾐﾋﾞｱFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液4～7mL | | は種前 | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | 1回 |
| ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| ｲﾈﾂﾄﾑｼ | ﾖｰﾊﾞﾙｼｰﾄﾞFS | 28 | | 乾燥種もみ1kg当り原液11mL(原液55mL/10aまで) | | は種前(浸種後) | ｺｰﾃｨﾝｸﾞ中又はｺｰﾃｨﾝｸﾞ後の種もみに塗沫処理 | 1回 |
| | 箱いり娘粒剤 | P3,4A,5,7 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |
| | 箱王子粒剤 | P3,4A,5 | | 1kg/10a | | は種時 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 1回 |