

2259 (様式 4)

2260

原案番号	品名	担当者
項目	原案によるデータ	
試料明細	I, II, III (ロット番号等)	(解説)
性状	色 溶解性 その他の特性	
確認試験		
(示性値)		
旋光度		
融点		
その他		
純度試験	(1)溶 状 (2)塩化物 (3)硫酸塩 (4)重金属 (5)ヒ 素 (6)類縁物質 その他	
乾燥減量 又は水分		
強熱残分		
製剤試験		
その他の試験		
定量法		
貯法		
標準品		
試薬・試液		
カラム情報		

2261 (備考)

2262

1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。

2263

2. 用紙が 2 枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。

2264

3. カラム情報の開示は、要望した者が検討データを提出した時に限る。

2265

2266
2267

(様式5)

項目	規格及び試験方法（案）	他の公定書（名称）
日本名 英名 日本名別名 構造式 分子式及び 分子量 化学名 (CAS 番号) 基原及び 含量規定 性状 確認試験 以下略		

2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274

(備考)

- 用紙は、日本工業規格 A4 縦又は横とすること。
- 用紙が 2 枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。
- 他の公定書の名称欄には、例えば米国薬局方など、具体的な名称を記載するとともに、複数の公定書がある場合には、適宜欄を設けること。
- 試薬・試液も項目の一つとして記載すること。

2275
2276

(様式 6)

項目	採用案及び関係情報
名称	採用案 日本名 英名 日本名別名 関係情報 JAN, INN 等 採用理由など
化学名	採用案 関係情報 JAN, INN 等 採用理由など
C A S 番号	採用案 関係情報（塩基、塩、無水物等関連するものの番号など）
構造式	採用案 関係情報 JAN, INN 等 採用理由など

2277
2278
2279
2280
2281

(備考)

1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
2. 用紙が 2 枚以上となる場合は、それぞれの用紙の下に、当該品目名とページ数を記入すること。
3. 作成にあっては、書式の外枠を設定する必要はないこと。

2282 別添 1

「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法

2284 日本薬局方標準品品質標準の原案提出にあたっては、以下の 1) から 6) の資料を様式-標 1 ~ 標 6 に従って
2285 作成して提出すること。

2286 資料の提出にあたっては、様式-標 1 から様式-標 6 の紙媒体と電子媒体の両方の資料を医薬品各条原案と同
2287 様に提出すること。

1) 「日本薬局方標準品品質標準」原案の総括表

2289 作成方法：「様式-標 1」を用いて作成する。

2290 作成上の留意事項

- 2291 ① 省略した様式がある場合は、備考欄にその理由を記載すること。
- 2292 ② 「適用医薬品各条名」欄には、当該標準品の使用を規定する全ての医薬品各条について網羅的に記載す
2293 ること。
- 2294 ③ 「適用規格項目」欄には、当該標準品の使用が規定される全ての規格項目を記載すること。
- 2295 ④ 「試験方法」欄には、当該標準品の使用が規定される規格項目の試験方法を簡略記載すること。
- 2296 ⑤ 「使用量」欄には、医薬品各条の記載に従って試験を 1 回実施するのに必要な量を記載すること。使用
2297 量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。乾燥後秤量の場合は、「乾
2298 燥後」と記載すること。また、別途水分を測定する場合などでは、別途測定に必要な量を付記すること。

2) 「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2300 作成方法：「様式-標 2」を用いて作成する。

2301 作成上の留意事項

- 2302 ① 標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載
2303 すること。
- 2304 ② 医薬品各条とは目的を異にするものであるので、試験方法等の記載は日局原案作成要領に従う必要はない。
- 2305 ③ 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。
- 2306 ④ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬、カラム等を銘柄名で記
2307 載しても差し支えない。

3) 標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2309 作成方法：「様式-標 3」を用いて作成する。

2310 作成上の留意事項

- 2311 ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。
- 2312 ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、各試験の測定値などを記載すること。
- 2313 ③ 代表的なスペクトルデータやクロマトグラム、液体クロマトグラフィーの試験条件やシステム適合性デ
2314 ータなども記載すること。なお、赤外吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトル等のスペクトルでは吸収
2315 の帰属も記載し、液体クロマトグラフィーなどにおいては分析法バリデーションも提出すること。
- 2316 ④ 試験に用いた機器など（測定機器、カラム、薄層板、特殊試薬等を含む）の具体的な名称（銘柄名等）も
2317 記載すること。特に、水分測定用試液（容量滴定法）又は水分測定用陽極液及び陰極液（電量滴定法）
2318 についてはその銘柄名を必ず記載すること。
- 2319 ⑤ 不純物の本質が特定されている場合には、不純物の化学名、構造式等を記載すること。
- 2320 ⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えな
2321 い。

4) 日本薬局方標準品の保存方法及び安定性に関する資料

2323 作成方法：「様式-標 4」を用いて作成する。

2324 作成上の留意事項

- 2325 ① 標準品原料提供者における自家標準物質の実際の保存方法による保存条件及び保存容器を記載する。
2326 ② 安定性のデータは標準品原料提供者の実際の保存方法におけるデータを記載すること。
2327 ③ 安定性データには、試験方法（試験条件を含む）を明示し、クロマトグラムなどのデータも添付すること。
2328 ④ 密封容器を使用する場合や冷蔵又は冷凍保存である場合には、保存方法の設定理由を記載すること。なお、安定性試験に基づいて設定した場合はその根拠となったデータ（適切な時点におけるクロマトグラム等を含む）を別に添付すること。
2329 ⑤ 標準品の取扱いにおいて留意すべき性質を洩れなく記載すること。
2330 ⑥ その他の項には、「酸化を受けやすいので不活性ガス置換して保存する必要がある」などの標準品の取
2331 扱い及び保存上留意すべき性質について記載すること。
2332

2333 5) 日本薬局方標準品原料の精製法に関する資料

2334 作成方法：「様式-標5」を用いて作成する。

2335 作成上の留意事項

- 2336 ① 入手した原料の品質が標準品としての品質に相応しくないと判断された場合に、標準品製造機関は精製などを行うことがあるので、その参考としての精製法を記載すること。
2337 ② 当該標準品原料の精製法が極めて特殊な技術を要する場合、精製法が知的財産権の範疇にある場合、又
2338 は精製の必要がある場合に原料提供者が精製することを確約できる場合などにあっては、その旨を備考欄に記載することによって、「精製法」欄の記載を省略することができる。

2339 6) 日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2340 作成方法：「様式-標6」を用いて作成する。

2341 作成上の留意事項

- 2342 ① 標準品に相応しい品質の原料を供給可能な提供者及び提供要件について記載すること。
2343 ② 供給可能量は、「○○～○○g」、「○○g以下」のような記載でも差し支えない。
2344 ③ 価格は、「○○円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。
2345 ④ 納期の項には、受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。
2346 ⑤ その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約○○mgずつをアンプル充填し
2347 て供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。
2348

2349 (注) 提出方法は、第二部 8. 資料の提出方法を参照すること。

2350 (備考)

- 2351 1. 用紙は、日本工業規格 A4 縦とすること。
2352 2. 用紙が2枚以上となる場合は、様式ごとに用紙の下に、当該標準品名とページ数を記入すること。
2353 3. 各用紙の欄外に記載された（備考）及び「記載上の留意点」は提出資料の作成においては記載する必要は
2354 ない。
2355

2359
2360
2361
2362

(様式・標 1)

「日本薬局方標準品品質標準」原案総括表

平成 年 月 日

原案整理番号		*		
標準品名称		標準品		
担当者連絡先	会社名			
	氏名			
	所属部署			
	連絡先住所	〒		
	電話・FAX番号	電話	FAX	
	電子メールアドレス			
適用医薬品各条名 ^{*1}		適用規格項目 ^{*2}	試験方法 ^{*3}	使用量 ^{*4}
備考 ^{*5}				

2363 (備考) *印の箇所は記入しないこと。

2364 記載上の留意点

2365 *1: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての医薬品各条名を網羅的に記載すること。

2366 *2: 当該標準品の使用が規定されることになる全ての規格項目を記載すること。

2367 *3: 当該標準品の使用が規定されることになる規格項目での試験方法名を記載すること。

2368 *4: 使用量は局方記載に従って試験を1回実施するのに必要な量を記載すること。

2369 使用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。

2370 乾燥後秤量の場合は、「乾燥後」と記載すること

2371 別途水分測定などの場合には別途測定に必要な量を付記すること

2372 *5: 省略した様式がある場合は、その理由を記載すること。

2373

2374

「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2375

(様式-標2)

2376

[標準品の名称]

[標準品の構造式]

[分子式及び分子量]

[化学名, CAS番号]

性状：外観

(色, 形状を記載する。)

確認試験

1. 紫外可視吸収スペクトルによる確認試験法
2. 赤外吸収スペクトルによる確認試験法
3. 核磁気共鳴スペクトルによる確認試験法
4. 薄層クロマトグラフィーによる確認試験法
5. 対イオンの確認試験法

(原則として1, 2及び3の試験法を設定し, 必要に応じて5の試験法を設定し, 用途試験法に応じて4の試験法を設定する。)

示性値

1. 融点
2. 旋光度
3. その他
(必要に応じて1, 2, 又は3を設定する。)

純度試験

1. 類縁物質
(原則として液体クロマトグラフィーによる試験法を設定し, 用途試験法に応じて薄層クロマトグラフィーによる試験法も設定する。)
2. 残留溶媒
(必要に応じて, ガスクロマトグラフィー又は液体クロマトグラフィーによる試験法を設定する。)

乾燥減量又は水分

(医薬品各条での用途に応じていずれかを設定する。)

定量法

(滴定法などによる絶対定量法を設定する。自家標準物質をマスバランス法で評価している場合であっても, 絶対定量法がある場合はその方法を設定する。)

貯法 保存条件

容器

(自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが, 安定性試験に基づいて設定する場合は貯法の根拠となったデータを様式-標4に添付すること。)

2377

(備考) 作成にあっては, 書式の外枠を設定する必要はない。

2378

記載上の留意点

2379

① 標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載すること。

2380

② 試験方法には, 品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。

2381

③ 試験方法の記載においては, 日局の記載方法に拘束されることなく, 特殊な試薬などを銘柄名により指定しても差し支えない。

2382

2383

2384

2385

標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2386

(様式-標3)

2387

原案整理番号	*	標準品名	担当者
試料明細	試料番号（ロット番号）：		
項目	原案によるデータ		
性状	色 形状		(解説)
確認試験	(1) UV 法 (2) IR 法 (3) NMR 法 (4) TLC 法 (5) 対イオン		
旋光度			
融点			
その他			
純度試験	(7)類縁物質 (8)残留溶媒 (9)その他		
乾燥減量 又は 水分			
定量法	滴定法		

2388

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2389

記載上の留意点

2390

① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。

2391

② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。

2392

③ HPLC の試験条件やシステム適合性データ、スペクトル、クロマトグラム等も記載すること。

2393

④ 試験に用いた機器等（測定機器、カラム、薄層板、特殊試薬等を含む）の具体的名称（銘柄名など）も記載すること。特に、水分測定用試液（容量滴定法）又は水分測定用陽極液及び陰極液（電量滴定法）についてはその銘柄名を必ず記載すること。

2394

⑤ 不純物の本質が特定されている場合には、不純物の化学名、構造式等を記載すること。

2395

⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えない。

2396

2397

2398

2399

2400

日本薬局方標準品の保存方法及び安定性に関する資料

2401

(様式-標4)

原案整理番号	*
標準品名称	標準品

2402

保存容器* ¹				
保存条件* ¹				
上記の保存容器、保存条件における安定性（不純物量などの経時変化）* ²				
不純物総量* ³ (%)	初期値	月（年）	月（年）	月（年）
試験方法：				
水分／乾燥減量 (%)	初期値	月（年）	月（年）	月（年）
保存方法の設定理由* ⁴				
その他のコメント				

2403

吸湿性	有	無
	根拠データ：	
光安定性		
その他* ⁵		

2404

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2405

記載上の留意点

2406

*1：標準品原料提供者における自家標準物質の実際の保存方法による保存条件及び保存容器を記載する。

2407

*2：安定性のデータは標準品原料提供者の実際の保存方法におけるデータを記載すること。クロマトグラム等は別に添付する。

2408

*3：不純物のデータには、試験方法を明示すること。

2409

*4：密封容器を使用する場合や冷蔵又は冷凍保存である場合には、保存方法の設定理由を記載すること。なお、安定性試験に基づいて設定した場合は貯法の根拠となったデータ（適切な時期におけるクロマトグラムなどを含む）を別に添付すること。

2410

*5：その他の項には、「酸化を受けやすいので不活性ガス置換して保存する必要がある」などの標準品の取扱い及び保存において留意すべき性質について記載すること

2411

2412

2413

2414

2415

2416

日本薬局方標準品原料の精製法に関する資料

2417

(様式-標5)

2418

標準品名 称	標準品
精 製 法	
備 考	

2419

記載上の留意点

「精製法」を記載しない場合は、備考欄にその理由を記載すること。

2420

2421

2422

日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2423

(様式-標6)

2424

原案整理番号		*
標準品名称		標準品
標準品原料提供者及び連絡先 *1	会社名	
	担当者氏名	
	所属部署	
	連絡先住所	〒
	電話・FAX番号	電話 FAX
	電子メールアドレス	
供給可能量 *2		
価格 *3		
納期 *4		
その他の *5		
備考		

2425

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2426

記載上の留意点

2427

*1: 標準品としての品質に相応しい原料の供給可能な提供者について記載し、標準品原料の品質や入手等に関する問い合わせに対応できる担当者及び連絡先を記入する。

2429

*2: 供給可能量は、1回の供給依頼に対して対応できる量の概数を記載し、「〇〇～〇〇g」、「〇〇kg以下」のような記載でも差し支えない。

2431

*3: 価格は「〇〇円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。

2432

*4: 受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。

2433

*5: その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇mgずつをアンプル充填して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。

2435

2436 別添 2

「標準品品質標準」原案の提出資料とその作成方法
(生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品) 標準品)

2439 日本薬局方 (生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品)) 標準品品質標準の原案提出にあたっては、以下の 1) から 4) の資料を様式-標生 1 ~ 標生 4 に従って作成し提出すること。

2440 資料の提出にあたっては、様式-標生 1 から様式-標生 4 の紙媒体と電子媒体の両方の資料を医薬品各条原案
2441 と同様に提出すること。

2443 1) 「日本薬局方標準品品質標準」原案の総括表

2444 作成方法：「様式-標生 1」を用いて作成する。

2445 作成上の留意事項

- 2446 ① 省略した様式がある場合は、備考欄にその理由を記載すること。
- 2447 ② 「適用医薬品各条名」欄には、当該標準品の使用を規定する全ての医薬品各条について網羅的に記載
2448 すること。
- 2449 ③ 「適用規格項目」欄には、当該標準品の使用が規定される全ての規格項目を記載すること。
- 2450 ④ 「試験方法」欄には、当該標準品の使用が規定される規格項目の試験方法を簡略記載すること。
- 2451 ⑤ 「使用量」欄には、医薬品各条の記載に従って試験を 1 回実施するのに必要な量を記載すること。使用
2452 用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。使用量が医薬品各条に記載
2453 されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。乾燥後秤量の場合は、「乾燥後」と記載
2454 すること。また、別途水分を測定する場合などでは、別途測定に必要な量を付記すること。

2455 2) 「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

2456 作成方法：「様式-標生 2」を用いて作成する。

2457 作成上の留意事項

- 2458 ① 標準品確立時に標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載すること。
- 2459 ② 標準品の単位の値付けの方法 (単位の定義設定の経緯も含む) 及び標準品の更新の方法について記載
2460 すること。
- 2461 ③ 貯法の保存条件及び保存期間に関する情報を記載すること。
- 2462 ④ 適切な国際標準品がある場合については、国際標準品を基準に品質標準の設定を行う。
- 2463 ⑤ 適切な国際標準品などがない場合については、承認書に規定されている標準物質の規格に基づき、品質標準を設定する。
- 2464 ⑥ 医薬品各条とは目的を異にするものであるので、試験方法などの記載は日局原案作成要領に従う必要
2465 はない。
- 2466 ⑦ 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。
- 2467 ⑧ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬、カラム等を銘柄名
2468 で記載しても差し支えない。

2471 3) 標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2472 作成方法：「様式-標生 3」を用いて作成する。

2473 作成上の留意事項

- 2474 ① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載すること。
- 2475 ② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、各試験の測定値などを記載すること。
- 2476 ③ 液体クロマトグラフィーを用いた場合、代表的なクロマトグラム、試験条件やシステム適合性データ
2477 なども記載すること。
- 2478 ④ 試験に用いた機器など (測定機器、カラム、特殊試薬などを含む) の具体的な名称 (銘柄名など) も記
2479 載すること。
- 2480 ⑤ 不純物が特定されている場合、関係データを記載すること。

2481 ⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支え
2482 ない。自家標準物質確立時と異なる新規の品質標準を設定する場合には新規の品質標準に基づくデー
2483 タも提出すること。

2484 4) 日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2485 作成方法：「様式-標生4」を用いて作成する。

2486 作成上の留意事項

- 2487 ① 標準品に相応しい品質の原料を供給可能な提供者及び提供要件について記載すること。
- 2488 ② 供給可能量は、「〇〇～〇〇g」、「〇〇g以下」のような記載でも差し支えない。
- 2489 ③ 価格は、「〇〇円/g程度」などの概数でも差し支えありません。無償の場合は「無償」と記載する
2490 こと。
- 2491 ④ 納期の項には、受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。
- 2492 ⑤ その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇mgずつをアンプル充填
2493 して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。

2494 (注) 提出方法は、第二部 8. 資料の提出方法を参照すること。

2495 (備考)

- 2496 1. 用紙は、日本工業規格A4縦とすること。
- 2497 2. 用紙が2枚以上となる場合は、様式ごとに用紙の下に、当該標準品名とページ数を記入すること。
- 2498 3. 各用紙の欄外に記載された（備考）及び「記載上の留意点」は提出資料の作成においては記載する必要は
2499 ない。

2501
2502 (様式-標準 1)
2503
2504

「日本薬局方標準品品質標準」原案総括表

平成 年 月 日

原案整理番号	*			
標準品名称	標準品			
担当者連絡先	会社名			
	担当者氏名			
	所属部署			
	連絡先住所	〒		
	電話・FAX番号	電話	FAX	
	電子メールアドレス			
適用医薬品各条名 ^{*1}	適用規格項目 ^{*2}	試験方法 ^{*3}	使用量 ^{*4}	
備考 ^{*5}				

- 2505 (備考) *印の箇所は記入しないこと。
 2506 記載上の留意点
 *1 : 当該標準品の使用が規定されることになる全ての医薬品各条名を網羅的に記載する。
 *2 : 当該標準品の使用が規定されることになる全ての規格項目を記載すること。
 *3 : 当該標準品の使用が規定されることになる規格項目での試験方法名を記載すること。
 *4 : 使用量は局方記載に従って試験を1回実施するのに必要な量を記載すること。
 使用量が各条に記載されていない場合は、大略の使用量を括弧書きで示すこと。
 乾燥後秤量の場合は、「乾燥後」と記載すること
 別途水分測定などの場合には別途測定に必要な量を付記すること
 *5 : 省略した様式がある場合は、その理由を記載すること。

2516
2517

「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料
[生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）力価標準品]

2518
2519

[標準品の名称]
[標準品の構造式]
[分子式及び分子量（標準品の本質に応じて記載する）] [CAS番号（標準品の本質に応じて記載する）]
本質、由来
性状：外観 (色、形状を記載する。)
力価定量法 (力価の単位の由来・定義、力価検定に用いた国際標準品等、力価試験法を記載する)
物質量 (必要に応じて設定する。)
貯法 保存条件 容器 (自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが、安定性試験に基づいて設定する場合は貯法の根拠となったデータを添付する。)

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527

（備考）作成にあつては、書式の外枠を設定する必要はない。

記載上の留意点

- ① 標準品確立時に標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載する。
- ② 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。
- ③ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬などを銘柄名により指定しても差し支えない。

2528

2529

「日本薬局方標準品品質標準」原案に関する資料

[生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）理化学試験用標準品]

2530

2531

(様式-標生 2(2))

[標準品の名称]

標準品の構造式

[分子式及び分子量（標準品の本質に応じて記載する）]

[CAS 番号（標準品の本質に応じて記載する）]

本質、由来

性状：外観

（色、形状を記載する。）

構造確認あるいは純度試験に用いる標準品の場合：①構造に関して得られている情報、②純度（例えばクロマトグラム的純度）に関するデータ、③試験項目と試験方法 を記載する

定量用標準品の場合： 物質量を定めた経緯及び試験方法を記載する

貯法 保存条件

容器

（自家標準物質の実際の保存条件及び容器を記載することで差し支えないが、安定性試験に基づいて設定する場合は貯法の根拠となったデータを添付する。）

2532

（備考）作成にあっては、書式の外枠を設定する必要はない。

2533

記載上の留意点

2534

① 標準品確立時に標準品原料候補の品質評価に必要なデータを得るために実施すべき品質試験項目とその試験方法を記載する。

2535

② 試験方法には、品質試験を支障なく実施するのに必要な事項を洩れなく記載すること。

2536

③ 試験方法の記載においては、日局の記載方法に拘束されることなく、特殊な試薬などを銘柄名により指定しても差し支えない。

2537

2538

2539

2540

標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2541

[生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）力価標準品]

2542

(様式-標生 3(1))

2543

原案整理番号	*	標準品名	担当者
試料明細	試料番号（ロット番号）：		
項目	原案によるデータ		
本質・由来			(解説)
性状・外観	色 形状		
力価定量法 (物質量)			

2544

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2545

記載上の留意点

2546

① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。

2547

② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。

2548

③ 試験条件なども記載すること。

2549

④ 試験に用いた機器などの具体的な名称（銘柄名など）も記載すること。

2550

⑤ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えない。

2551

2552

2553

標準品品質標準に基づいた実測値に関する資料

2554

[生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）理化学試験用標準品]

2555

(様式-標生3(2))

2556

原案整理番号	*	標準品名	担当者
試料明細	試料番号（ロット番号）：		
項目	原案によるデータ		
本質・由来 性状・外観 (以下必要な項目 を記載)	色 形状		(解説)

2557

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2558

記載上の留意点

2559

① 標準品相当品又は現在使用している自家標準物質の品質試験実測値を記載する。

2560

② 数値結果で評価する試験については、適否の評価結果ではなく、実測データなどを記載すること。

2561

③ HPLC の試験条件やシステム適合性データ、クロマトグラム等も記載すること。

2562

④ 試験に用いた機器などの具体的な名称（銘柄名など）も記載すること。

2563

⑤ 不純物の本質が特定されている場合には、不純物の名称などを記載すること。

2564

⑥ 本資料のために新たに試験を実施することなく、自家標準物質確立時のデータを提出しても差し支えない。

2565

2566

2567

日本薬局方標準品原料の供給に関する資料

2568

(様式-標生4)

2569

原案整理番号		*	
標準品名称		標準品	
標準品原料提供者及び連絡先 *1	会社名		
	担当者氏名		
	所属部署		
	連絡先住所	〒	
	電話・FAX番号	電話	FAX
	電子メールアドレス		
供給可能量 *2			
価格 *3			
納期 *4			
その他の *5			
備考			

2570

(備考) *印の箇所は記入しないこと。

2571

記載上の留意点

2572

*1: 標準品としての品質に相応しい原料の供給可能な提供者について記載し、標準品原料の品質や入手等に関する問い合わせに対応できる担当者及び連絡先を記入する。

2573

*2: 供給可能量は、1回の供給依頼に対して対応できる量の概数を記載し、「〇〇～〇〇g」、「〇〇kg以下」のような記載でも差し支えない。

2574

*3: 価格は「〇〇円/g程度」などの概数でも差し支えない。無償の場合は「無償」と記載すること。

2575

*4: 受注から納品までに要する標準的期間を記載すること。

2576

*5: その他の項には、供給予定の標準品原料に関するその他の情報（例：約〇〇mgずつをアンプル充填して供給する）や、継続的な供給が見込めない場合にはその旨を記載すること。

2577

2578

2579

2580

2581

付表及び用字例

2582

付表

2583

塩化物の%換算表

2584

0.01 mol/L 塩酸 0.25~0.30~0.45 mL (88.6~106~160 µg/50 mL Cl) (上方)

2585

0.01 mol/L 塩酸 0.70~0.85~1.0 mL (248~302~355 µg/50 mL Cl) (側方)

試料(g) 0.01 mol/L塩酸(mL)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0.25	089	044	030	022	018	015	013	011	010	009	006	004	004	003	002	002	002	002
0.30	106	053	035	026	021	018	015	013	012	011	007	005	004	004	003	003	002	002
0.35	124	062	041	031	025	021	018	016	014	012	008	006	005	004	004	003	003	002
0.40	142	071	047	036	028	024	020	018	016	014	009	007	006	005	004	004	003	003
0.45	160	080	053	040	032	027	023	020	018	016	011	008	006	005	004	004	004	003
0.70	248	124	083	062	050	041	035	031	028	025	016	012	010	008	007	006	006	005
0.80	284	142	095	071	057	047	040	036	032	028	019	014	011	009	008	007	006	006
0.90	320	160	107	080	064	054	046	040	036	032	021	016	013	011	009	008	007	006
1.0	335	178	119	089	071	059	051	044	039	036	024	018	014	012	010	009	008	007

2586 %の値は小数点以下の数値を示す。

2587

硫酸塩の%換算表

2588

0.005 mol/L 硫酸 0.35~0.40~0.50 mL (168~192~240 µg/50 mL SO₄) (上方)

2589

0.005 mol/L 硫酸 1.0~1.25~1.5 mL (480~600~720 µg/50 mL SO₄) (側方)

試料(g) 0.005 mol/L硫酸(mL)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0.35	168	084	056	042	034	028	024	021	019	017	011	008	007	006	005	004	004	003
0.40	192	096	064	048	038	032	027	024	021	019	013	010	008	006	005	005	004	004
0.45	216	108	072	054	043	036	031	027	024	022	014	011	009	007	006	005	005	004
0.50	240	120	080	060	048	040	034	030	027	024	016	012	010	008	007	006	005	005
1.0	480	240	160	120	096	080	068	060	053	048	032	024	019	016	014	012	011	010
1.1	528	264	176	132	106	088	075	066	059	053	035	026	021	018	015	013	012	010
1.2	576	288	192	144	115	096	082	072	064	058	038	028	023	019	016	014	013	012
1.3	624	312	208	156	125	104	089	078	069	062	042	031	025	021	018	016	014	012
1.4	672	336	224	168	134	112	096	084	075	067	045	034	026	022	019	017	015	013
1.5	720	360	240	180	144	120	103	090	080	072	048	036	029	026	020	018	016	014

2590 %の値は小数点以下の数値を示す。

2591

2592

重金属の ppm 及び%換算表

2593

鉛標準液 1.0~3.0 mL (10~30 µg/50 mL Pb) (上方)

2594

鉛標準液 3.0~4.5 mL (30~45 µg/50 mL Pb) (側方)

試料(g) 鉛 標準液(mL)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
1.0	0100	0050	0033	0025	0020	0017	0014	0012	0011	0010	0007	0005	0004	0003	0003	0002	0002	0002
2.0	0200	0100	0067	0050	0040	0033	0028	0025	0022	0020	0013	0010	0008	0007	0006	0005	0004	0004
2.5	0250	0125	0083	0062	0050	0042	0036	0031	0028	0025	0017	0012	0010	0008	0007	0006	0006	0005
3.0	0300	0150	0100	0075	0060	0050	0043	0038	0033	0030	0020	0015	0012	0010	0008	0008	0007	0006
3.5	0350	0175	0117	0088	0070	0058	0050	0044	0038	0035	0023	0018	0014	0012	0010	0009	0008	0007
4.0	0400	0200	0133	0100	0080	0067	0057	0050	0044	0040	0027	0020	0016	0013	0011	0010	0009	0008
4.5	0450	0225	0150	0112	0090	0075	0064	0056	0050	0045	0030	0022	0018	0015	0013	0011	0010	0009

2595 [例] 0020 とは 20 ppm, 0.0020% を示す。

2596

ヒ素の ppm 換算表

2597

ヒ素標準液 2.0 mL (2 µg As₂O₃)

試料(g) ヒ素 標準液(mL)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
2.0	20	13.3	10	8	6.6	5.7	5	4.4	4	3.6	3.3	3.1	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2	1.6	1.3	1

2598

2599

乾燥減量及び強熱残分の%記載法

% 試料(g)	0.05	0.1	0.5	1	5	10	20
0.05				(1)	(5)	(10)	(20)
0.1		(0.1)	(0.5)	(1.0)	(5.0)	10	20
0.5		(0.1)	(0.5)	(1.0)	(5.0)	10	20
1	(0.05)	(0.1)	0.5	1.0	5.0	10.0	20.0
5	(0.05)	(0.10)	0.5	1.0	5.0	10.0	20.0
10	0.05	(0.10)	0.50	1.00	5.00	10.00	20.00

2600

() を付したものはセミミクロ化学はかりを用いる。

原子量表 (2010)

(元素の原子量は、質量数 12 の炭素 (^{12}C) を 12 とし、これに対する相対値とする。ただし、 ^{12}C は核及び電子が基底状態にある中性原子である。)

多くの元素の原子量は一定ではなく、物質の起源や処理の仕方に依存する。原子量とその不確かさ[#]は地球上に起源をもち、天然に存在する物質中の元素に適用される。この表の脚注には、個々の元素に起こりうるもので、原子量に付随する不確かさを越える可能性のある変動の様式が示されている。原子番号 112 から 118 までの元素名は暫定的なものである。

元素名	元素記号	原子番号	原子量	脚注
アインスタイニウム*	Es	99		
亜鉛	Zn	30	65.38(2)	r
アクチニウム*	Ac	89		
アスタチン*	At	85		
アメリシウム*	Am	95		
アルゴン	Ar	18	39.948(1)	g r
アルミニウム	Al	13	26.9815386(8)	
アンチモン	Sb	51	121.760(1)	g
硫黄	S	16	32.065(5)	g r
イッテルビウム	Yb	70	173.054(5)	g
イットリウム	Y	39	88.90585(2)	
イリジウム	Ir	77	192.217(3)	
インジウム	In	49	114.818(3)	
ウラン*	U	92	238.02891(3)	g m
ウンウンオクチウム*	Uuo	118		
ウンウンクアジウム*	Uuq	114		
ウンウントリウム*	Uut	113		
ウンウンヘキシウム*	Uuh	116		
ウンウンベンチウム*	Uup	115		
エルビウム	Er	68	167.259(3)	g
塩素	Cl	17	35.453(2)	g m r
オスミウム	Os	76	190.23(3)	g
カドミウム	Cd	48	112.411(8)	g
ガドリニウム	Gd	64	157.25(3)	g
カリウム	K	19	39.0983(1)	
ガリウム	Ga	31	69.723(1)	
カリホルニウム*	Cf	98		
カルシウム	Ca	20	40.078(4)	g
キセノン	Xe	54	131.293(6)	g m
キュリウム*	Cm	96		
金	Au	79	196.966569(4)	
銀	Ag	47	107.8682(2)	g
クリプトン	Kr	36	83.798(2)	g m
クロム	Cr	24	51.9961(6)	
ケイ素	Si	14	28.0855(3)	r
ゲルマニウム	Ge	32	72.64(1)	

元素名	元素記号	原子番号	原子量	脚注
コバルト	Co	27	58.933195(5)	
コペルニシウム*	Cn	112		
サマリウム	Sm	62	150.36(2)	g
酸素	O	8	15.9994(3)	g r
ジスプロシウム	Dy	66	162.500(1)	g
シーボーギウム*	Sg	106		
臭素	Br	35	79.904(1)	
ジルコニウム	Zr	40	91.224(2)	g
水銀	Hg	80	200.59(2)	
水素	H	1	1.00794(7)	g m r
スカンジウム	Sc	21	44.955912(6)	
スズ	Sn	50	118.710(7)	g
ストロンチウム	Sr	38	87.62(1)	g r
セシウム	Cs	55	132.9054519(2)	
セリウム	Ce	58	140.116(1)	g
セレン	Se	34	78.96(3)	r
ダームスタチウム*	Ds	110		
タリウム	Tl	81	204.3833(2)	
タングステン	W	74	183.84(1)	
炭素	C	6	12.0107(8)	g r
タンタル	Ta	73	180.94788(2)	
チタン	Ti	22	47.867(1)	
窒素	N	7	14.0067(2)	g r
ツリウム	Tm	69	168.93421(2)	
テクネチウム*	Tc	43		
鉄	Fe	26	55.845(2)	
テルビウム	Tb	65	158.92535(2)	
テルル	Te	52	127.60(3)	g
銅	Cu	29	63.546(3)	r
ドブニウム*	Db	105		
トリウム*	Th	90	232.03806(2)	g
ナトリウム	Na	11	22.98976928(2)	
鉛	Pb	82	207.2(1)	g r
ニオブ	Nb	41	92.90638(2)	
ニッケル	Ni	28	58.6934(4)	r
ネオジム	Nd	60	144.242(3)	g
ネオン	Ne	10	20.1797(6)	g m
ネプツニウム*	Np	93		
ノーベリウム*	No	102		
バークリウム*	Bk	97		
白金	Pt	78	195.084(9)	
ハッショウム*	Hs	108		
バナジウム	V	23	50.9415(1)	
ハフニウム	Hf	72	178.49(2)	
パラジウム	Pd	46	106.42(1)	g
バリウム	Ba	56	137.327(7)	
ビスマス*	Bi	83	208.98040(1)	
ヒ素	As	33	74.92160(2)	
フェルミウム*	Fm	100		
フッ素	F	9	18.9984032(5)	

元素名	元素記号	原子番号	原子量	脚注
プラセオジム	Pr	59	140.90765(2)	
フランシウム*	Fr	87		
プルトニウム*	Pu	94		
プロトアクチニウム*	Pa	91	231.03588(2)	
プロメチウム*	Pm	61		
ヘリウム	He	2	4.002602(2)	g r
ベリリウム	Be	4	9.012182(3)	
ホウ素	B	5	10.811(7)	g m r
ボーリウム*	Bh	107		
ホルミウム	Ho	67	164.93032(2)	
ポロニウム*	Po	84		
マイトネリウム*	Mt	109		
マグネシウム	Mg	12	24.3050(6)	
マンガン	Mn	25	54.938045(5)	
メンデレビウム*	Md	101		
モリブデン	Mo	42	95.96(2)	g r
ユウロピウム	Eu	63	151.964(1)	g
ヨウ素	I	53	126.90447(3)	
ラザホージウム*	Rf	104		
ラジウム*	Ra	88		
ラドン*	Rn	86		
ランタン	La	57	138.90547(7)	g
リチウム	Li	3	[6.941(2)]†	g m r
リン	P	15	30.973762(2)	
ルテチウム	Lu	71	174.9668(1)	g
ルテニウム	Ru	44	101.07(2)	g
ルビジウム	Rb	37	85.4678(3)	g
レニウム	Re	75	186.207(1)	
レントゲニウム*	Rg	111		
ロジウム	Rh	45	102.90550(2)	
ローレンシウム*	Lr	103		

* : 不確かさは () 内の数字で表され、有効数字の最後の桁に対応する。例えば、亜鉛の場合の 65.38(2) は 65.38 ± 0.02 を意味する。

* : 安定同位体のない元素（次表参照）。これらの元素については原子量が示されていないが、プロトアクチニウム、トリウム、ウランは例外で、これらの元素は地球上で固有の同位体組成を示すので原子量が与えられている。

† : 市販品中のリチウム化合物のリチウム原子量は 6.939 から 6.996 の幅をもつ（「元素の同位体組成表 2010」の注 b を参照）。より正確な原子量が必要な場合は、個々の物質について測定する必要がある。

g : 当該元素の同位体組成が正常な物質が示す変動幅を超えるような地質学的試料が知られている。そのような試料中では当該元素の原子量とこの表の値との差が、表記の不確かさを越えることがある。

m : 不詳な、あるいは不適切な同位体分別を受けたために同位体組成が変動した物質が市販品中に見いだ

されることがある。そのため、当該元素の原子量が表記の値とかなり異なることがある。

r : 通常の地球上の物質の同位体組成に変動があるために表記の原子量より精度の良い値を与えることができない。表中の原子量は通常の物質全てに適用されるものとする。

安定同位体のない元素

この表は、原子量表（2010）で * を付した安定同位体のない元素についてまとめたものである。

原子番号	元素名	元素記号	同位体の質量数†
43	テクネチウム	Tc	97,98,99
61	プロメチウム	Pm	145,146,147
83	ビスマス	Bi	209
84	ポロニウム	Po	208,209,210
85	アスタチン	At	210,211
86	ラドン	Rn	210,211,222
87	フランシウム	Fr	212,222,223
88	ラジウム	Ra	226,228
89	アクチニウム	Ac	225,227
90	トリウム	Th	230,232
91	プロトアクチニウム	Pa	231,233
92	ウラン	U	233,234,235,236,238
93	ネプツニウム	Np	236,237
94	プルトニウム	Pu	238,239,240,241,242,244
95	アメリシウム	Am	241,243
96	キュリウム	Cm	243,244,245,246,247,248
97	バークリウム	Bk	247,249
98	カリホルニウム	Cf	249,250,251,252
99	アインスタiniウム	Es	252,254
100	フェルミウム	Fm	253,257
101	メンデレビウム	Md	258,260
102	ノーベリウム	No	255,259
103	ローレンシウム	Lr	251,261,262
104	ラザホージウム	Rf	265,267
105	ドブニウム	Db	267,268
106	シーボーギウム	Sg	265,271
107	ボーリウム	Bh	267,272
108	ハッシウム	Hs	269,277
109	マイトネリウム	Mt	268,276
110	ダームスタチウム	Ds	280,281
111	レントゲニウム	Rg	279,280
112	コペルニシウム	Cn	283,285
113	ウンウントリウム	Uut	283,284
114	ウンウンクアジウム	Uuq	288,289
115	ウンウンペンチウム	Uup	287,288
116	ウンウンヘキシウム	Uuh	291,292,293
118	ウンウンオクチウム	Uuo	294

†：現在確認されている質量数の例で、ビスマスを除く元素については下記文献 1 の Table3 に基づく。ビスマスについては下記文献 2 に基づき、放射性元素と判断した。

1. IUPAC Inorganic Chemistry Division, CIAAW : Atomic Weights of the Elements 2007. *Pure Appl.Chem.*, 81, 2131 (2009)
2. P. de Marcillac *et al.* : Experimental Detection of α -particles from the Radioactive Decay of Natural Bismuth. *Nature*, 422, 876 (2003).

この原子量表は、IUPAC の原子量表をもとに、日本化学会原子量委員会が作成したものである。

用字例

(注: 送りがなについてーアンダーラインは、注意して送るもの、
□印は送らないもの)

	よみ	使う字	使わない字 備考	
ア	あかるい あきらかに あげる あたためる あたらしい あたる あつかう あつめる あてる あらいこみ あらかじめ あらたに あらためる あらゆる あらわす	明るい 明らかに 上げる →加温する 新しい 当たる 扱う 集める 当てる 洗込み (名) 洗い込み (動) あらかじめ (副) 新たに 改める あらゆる 表 (現) す	明い 明かに 上る 新らしい 当る 扱う 集る 当る 予め 新らたに 全る 表 (現) わす あらわす 表→表面に出し 示す, 著わす 現→かくさずに 示す ある →若しくは 又は あわ あわす	明い 明かに 上る 新らしい 当る 扱う 集る 当る 予め 新らたに 全る 表 (現) わす あらわす 表→表面に出し 示す, 著わす 現→かくさずに 示す ある →若しくは 又は あわ あわす
イ	いおう いう いくぶん いざれ いちじるしい いっそう いったん いって いる いる いれる いわゆる いんてぐれーたー	硫黄 いう 幾分 いざれ (代) 著しい 一層 一端 いって いる いる 入れる いわゆる イテグレーター	イオウ 言う かわる 何れ 著るしい 行つて 居る 入る 所謂 イテグレーター	硫黄 いう 幾分 いざれ (代) 著しい 一層 一端 いって いる いる 入れる いわゆる イテグレーター
ウ	うしなう うすい (物) うすい (色) うすめる うちに うながす うるおす	失う 薄い うすい 薄める うちに 促す 潤す	希釈する 内に、中に 促す 潤す	失う 薄い うすい 薄める うちに 促す 潤す
エ	えがく えらぶ える	描く 選ぶ 得る	画く (get) → うる	えがく えらぶ える

	よみ	使う字	使わない字 備考
オ	おうとつ おおう おおきい おおむね おこなう おこる おそれ おだやかに おとし おのおの おのづから おびる おもな およそ および おわる	凹凸 覆う 大きい おおむね 行う 起こる おそれ 穏やかに 落とし 日々 おのづから 帶びる 主な およそ 及び 終わる	被う 大い 概ね 行なう 起る 恐れ、虞れ おだやかに 落し 自ら 凡そ 終る
カ	かいそう かえす かえって かかわらず かくはん かくはんする かける かさねる かじょう かりょう かつ かっしょく かなう かなならず かねる かび から	海藻 返す かえって かかわらず 攪拌 (名) →かき混ぜる 欠ける 重ねる 過剰 過量 かつ 褐色 かなう 必ず (副) 兼ねる かび ○から作る △から再結晶 ガラス 代わる	返えす 却て 拘らず 攪拌する 欠る
キ	かわる かんてん かげつ 10かしょ	かわる かんてん 箇月 10箇所	且つ 適う 必ず 兼る 徽 ○より作る △より再結晶 硝子 代る (代理・代人など) 変る (うつりかわる、変化) 寒天 ヶ月 10ヶ月所
	きしやく きめる きやりやーがす きようざつ きりあげ きりひらく きわめて きげん	希釈 決める キヤリヤーガス →混在 切上げ 切り開く 極めて 基原	決る キャリアーガス 夾雜 切りあげ 起源

	よみ	使う字	使わない字 備考		よみ	使う字	使わない字 備考	
ク	くふう くみあわせ くみかえ くらい くらべる くりかえす	工夫 組合せ(名) 組み合わせる(動) 組換え(名) 組み換える(動) くらい 比べる 繰り返す	位 比る 繰返えす		シ	しがたい しげき したがう したがって したのち したのちに しばしば しぶい しまう しめす しめる しめる しゃこう しやすい しゃへい じゅうてん じゅうぶん しゅうまつてん しゅうれんせい しょうじる じょうりゅう じょじょに しらべる しんとう	し難い 刺激 従う したがって(接) 従って(動) した後, した後に しばしば 渋い しまう 示す 湿る 絞める 遮光 しやすい 遮蔽 充填 十分に, 十分な →終点 收れん性 生じる 蒸留 徐々に 調べる →振り混ぜる	刺戟 従て 屢々 了う, 終う 湿める
	けいこう けいれん けた けんだく	螢光 けいれん 桁 懸濁	痙攣		ス	すくない ずつ すでに する すべて すみやかに	少ない ずつ 既に(副) 捨てる 全て 速やかに	少い 宛
	こえる こげる こころみる こたえ こたえる こと ごと ことなる この こまかい (洗い)こむ これら こんせき	超える 焦げる 試みる 答え こたえる こと ごと 異なる この 細かい (洗い)込む これら 痕跡	越える 焦る 試る 答(表中) 応える 事 毎 異なる 此の 細い 此等, これ等		セ	せん せんじょう	栓 洗净	捨る 総て, 凡て, セン 洗滌
	ざいけい さきに さける さげる さしこむ さしつかえない さまざま さら さらに ざんさ	剤形 先に 避ける 下げる 差し込む 差し支えない 様々 皿 更に(副詞) さらに(接続詞) →残留物	剤型 避る 下る 挿し込む(挿入) 差支えない		ソ	そう そうにゅう その そのほか それぞれ	沿う 挿入 その そのほか それぞれ	其の 其の他 夫々
			残渣		タ	だいたい たいてい たえず だえん たがいに たくわえる たしかめる だす ただ ただし ただちに たとえば たの ために たんぱくしつ	大体 大抵 絶えず 精円 互いに →保存する 確かめる 出す ただ ただし 直ちに 例えば(副) 他の ために タンパク質	絶ず だ円 貯える 確める だす 唯, 只 但し 直に 為に 蛋白質

	よみ	使う字	使わない字 備考		よみ	使う字	使わない字 備考
チ	ちいさい	小さい	小 <small>い</small>	丁度	ばかり	ばかり	秤
	ちかづく	近づく	近付く, 近づく		はかる	量る	測る, 計る→常用漢字
	ちょうど	ちょうど (副)			はじめて	初めて (副)	初て
	ちょうどふ	貼付			はじめの	初めの	
	ちょっと	ちょっと	一寸		はじめる	始める	
ツ	ついで	ついで	就いて, 付いて	宛	はずす	外す	
	ついで	次いで			はやい	速い	
	つぎに	次に			はんてん	斑点	
	つくる	作る			ばらめーたー	パラメーター	パラメータ
	つける	付ける			ひとしい	等しい	
	づつ	ずつ			ひとつ	一つ	
	つめる	詰める			ひとつずつ	一つずつ	
	つねに	常に			びん	瓶	ピン
	ていする	呈する			ふきん	付近	
テ	てきか	滴加	滴下	所	ふく	拭く	
	できる	できる	出来る		ふくざつ	複雜	
	でしけーたー	デシケーター	デシケーター		ふた	蓋	
	でーた	データ	データー		ふたたび	再び (副)	
	とおり	とおり	通り		ふりまぜる	振り混ぜる	振混ぜる
	とき	とき	時		ふれる	触れる	触る
	ときどき	時々	ときどき		ほか	ほか	
	とくに	特に (副)			ほど	ほど (助)	程
	ところ	ところ (・のところ)			ほとんど	ほとんど (副)	殆ど
	ともせん	共栓	共セン		ほぼ	ほぼ (副)	略々, 略ぼ
ト	ともなう	伴う	伴 <u>な</u> う	成べく, 成可く	ますます	ますます (副)	益々
	ともに	共に (副)	供に		まず	まず (副)	
	とりあつかい	取扱い (名)			ませあわせ	混合せ (名)	
	とりだし	取り扱い (動)			ませる	混ぜ合わせ (動)	
		取出し (名)			また	混ぜる	混る
		取り出し (動)			また	又は (接)	又, 亦, 復
					まだ	まだ	未だ
					まで	まで (助)	迄
					まま	まま	儘
ナ	ないし	ないし	乃至	満たす	まひ	まひ	麻ひ
	なお	なお (副)	尚		みがく	磨く	
	なかば	半ば	中ば		みぞ	溝	
	ながら	ながら	乍ら		みたす	満たす	満す, 充たす
	なづける	名付ける	名づける		みとめる	認める	認る
	など	など	等		みなす	みなす	見なす, 見做す
	ならびに	並びに			みられる	見られる	
	なるべく	なるべく			むしろ	むしろ	寧ろ
					むずかしい	難しい	結ぶ
ニ	にかわじょう	にかわ状	膠状	結ぶ	むすぶ	結ぶ	結ぶ
	にごる	渦る			めずらしい	珍しい	珍い
	にそう	二層	2層		めんどう	面倒	
	にゅうぱち	乳鉢					
ヌ	ぬぐう	ぬぐう	拭う	珍しい			
	ぬらす	ぬらす	濡らす				
ネ	ねんちゅう (ねんちょう)	粘稠		面倒			
	のぞく	除く					
	のち	後					
	のちに	後に					
	のべる	述べる					
ノ	のり	のり	述る				
			糊				

	よみ	使う字	使わない字 備考
モ	もえる	燃える	燃る
	もし	もし (副)	若し
	もしくは	若しくは	
	もちいる	用いる	用る
	もちろん	もちろん	勿論
	もつ	持つ	
	もっとも	最も (副)	
	もっぱら	専ら (副)	
	もどす	戻す (もどす)	
	もとづく	基づく	基く
	もとに	下に	許に
	もの	もの	物, 者→常用漢字
	もる	漏る	
ヤ	やすい	やすい	易い
	やはり	やはり (副)	矢張り
	やむをえず	やむを得ず	止むを得ず
	やや	やや (副)	稍々
	やわらかい	柔らかい	柔い, 軟らかい
ユ	ゆえ	ゆえ	故
	ゆく	行く	
ヨ	よい	良い	好い
	よういに	容易に	
	ようす	様子	
	よう	よう	様に
	ようやく	ようやく	漸く
	ようゆう	→融解	溶融
	よる	よる	依る, 因る
	より	より	[比較するときに用いる 例: ○○より△△が大きい]
リ	りゅうぶん	留分	溜分
	りんぱ	リンパ	淋巴
ロ	ろう	ろう	蠍 (正名はロウ)
	ろうと	漏斗	
	ろかする	ろ過する	濾過する, 沥過する
ワ	わかる	わかる	分る, 判る, 解る
	わかる	分ける	分る
	わずかに	わずかに	
	僅かに		
	わたって	わたって	亘って

(注) 文中の (名) は名詞, (代) は代名詞, (連) は連体詞,
 (動) は動詞, (助) は助詞, (副) は副詞及び (接) は接続詞として用いる場合に使う字であることを意味する。